

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICILES**

DLP 31-7-75 172052

ABONNEMENT ANNUEL :

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

50 F
nouvelle série
n° 24

Eudémis : Les pontes signalées dans le bulletin n° 23 du 15 juillet ont avorté en raison des conditions climatiques défavorables.

Cependant dans les vignobles en situations tardives, il convient de vérifier l'importance des pénétrations, et le cas échéant, effectuer un traitement.

Cochylis: Dans les vignes où ce ravageurs se manifeste (région de LIMOUX (11) et du FENOUILLEDE (66) il est nécessaire d'effectuer un traitement, Le vol est en nette recrudescence depuis une dizaine de jours. Le repérage des premiers dégâts permet de bien placer l'application.

Acaries : Des foyers de pullulations sont signalés dans divers vergers, leur élimination sera obtenue par la pulvérisation (abondante) d'un acaricide n'ayant qu'une faible action sur la faune secondaire (cyhexatin, dicofol, tetrasul).

Oïdium: Les oïdiums continuent de se manifester sur abricotiers et pommiers, parfois sur pêchers.

Nous rappelons qu'après les fortes attaques du printemps et du début de l'été il convient de continuer la lutte, aussi bien sur les arbres encore porteurs de fruits que sur ceux dont la récolte est terminée.

Cylindrosporiose: Nous rappelons notre précédente recommandation (bulletin n° 17) relative au traitement de la cylindrosporiose (anthracnose) destiné à prévenir le dessèchement du feuillage.

Tordeuse Orientale Commencer la protection des fruits arrivant à maturité entre le 1er et le 15 septembre. Continuer d'assurer la protection des fruits murissant avant le 1er septembre. En raison du faible nombre de fruits, les risques d'attaques sont plus importants. Les jeunes pousses seront également très recherchées par les femelles pondeuses ; il importe donc de traiter les jeunes arbres en cours de formation.

Fusicoccum : Les plantations contaminées, ou celles qui les voisinent, doivent être traitées après récolte. Les plantations irriguées par aspersion sur frondaison sont particulièrement vulnérables.

Carpocapse : Assurer la protection permanente des fruits. Pour les vergers situés à proximité de pêcheraies utiliser un produit efficace à la fois contre le carpocapse et la tordeuse orientale, ce dernier ravageur étant susceptible de se déplacer vers les vergers de fruits à pépins.

Zeuzère : Consulter notre avis du 25 juin.

Respectez les délais d'emploi des pesticides avant récolte!

Le Chef de la Circonscription,

Les Ingénieurs.

P. BERVILLE

CHRESTIAN, TISSOT, TROUILLON

Tirage du 23 juillet

1 450 exemplaires

P153